

Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index BASMI

SCORE			
	0	1	2
Tragus til vegg	<15cm	15-30cm	>30cm
Lumbal fleksjon	>4cm	2-4cm	<2cm
Cervical rotasjon	>70°	20°-70°	<20°
Lumbal sidebøy	>10cm	5-10cm	<5cm
Intermalleolær avstand	>100cm	70-100cm	<70cm

Mild sykdomsgrad : **0**

Moderat sykdomsgrad: **1**

Alvorlig sykdomsgrad: **2**

Resultater for cervical rotasjon og lumbal sidebøy er gjennomsnitt av høyre og venstre mål.

Scoring range 0-10.

Tragus til vegg: Pasienten står med helene inntil vegg, strake knær, skuldre tilbake, og plasserer hodet så langt tilbake som mulig.

Lumbal fleksjon: Sett merke 5 cm under og 10 cm over en strek mellom SISP. Mål avstanden mellom de to merkene når pasienten er max. foroverbøyd med strake knær.

Cervical rotasjon: Pas. ryggliggende, mål med Myrinometer

Lumbal sidebøy: Måles ved FFD i full sidebøy uten og bøye forover eller i knærne. Merke ved midterste finger, forskjell mellom start og ende, snitt høyre og venstre.

Intermall. avstand: Ryggliggende pasient, strake knær, tær peker rett opp. Pasienten abduker, avstand måles mellom malleoler.